

DİYALİZ SORUMLU UZMAN SORULARI

1. PROKSİMAL TUBULUSTAN FOSFATIN GERİ EMİLİMİNİ HANGİSİ İNHİBE EDER ?
 - A. PARATHORMON
 - B. GLUKAGON
 - C. İNSÜLİN
 - D. Ag-II
 - E. KATEKOLAMİNLER

1. ADH İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
 - A. NEFROJENİK DİABETES İNSİPIDUSTA RENAL TUBULUSLAR ADH'YA YANIT VERMEZ.
 - B. PROSTAGLANDİNLER ADH'NİN ETKİLERİNİ ANTAGONİZE EDER.
 - C. LİTYUM ADH'NİN RENAL TUBULER ETKİLERİNİ BLOKE EDER.
 - D. ADH RENAL TUBULUS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ APİKAL SU KANALLARI (AQUAPORIN) ÜZERİNDEN GÖSTERİR.
 - E. HEPİ.

1. RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. ATEROSKLEROZA BAĞLI DARLIK RENAL ARTERİN PROKSİMALİNDEDİR.
 - B. FİBROMUSKULER DİSPLAZİLER İÇİNDE EN SIK GÖRÜLENİ "MEDIAL" FORMDUR.
 - C. TROMBOZİSİN EN YAYGIN OLDUĞU FİBROMUSKULER DİSPLAZİ "MEDIAL" FORMDUR.
 - D. ATEROSKLEROZA BAĞLI RVH GENELLİKLE 50 YAŞ ÜZERİNDE GÖRÜLÜR.
 - E. ATEROSKLEROTİK FORMDA SIKLIKLA TOTAL OKLÜZYON GÖRÜLÜR.

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ "REZİSTAN HİPERTANSİYON" KAVRAMINI TANIMLAR ?
 - A. İKİ ADET ANTİHİPERTANSİF İLACA RAĞMEN, AKB > 140 / 90 mmHg OLMASIDIR.
 - B. HİPERPOTASEMİ REZİSTAN HİPERTANSİYONA NEDEN OLUR.
 - C. İNSÜLİN DİRENCİ OLANLARDA SIK GÖRÜLÜR.
 - D. TÜM HİPERTANSİFLER İÇİNDE PREVALANSI % 30'UN ÜZERİNDEDİR.
 - E. YETERSİZ SODYUM ALANLARDA DAHA SIKTIR.

1. ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. BETA BLOKERLER HDL-KOLESTEROL DÜZEYLERİNİ DÜŞÜRÜR.
 - B. Ca KANAL BLOKERLERİ RENAL KAN AKIMINI ARTIRIRLAR.
 - C. ALFA-BLOKERLER İNSÜLİN DUYARLILIĞINI ARTIRIRLAR.
 - D. DİÜRETİKLER LDL-KOLESTEROL DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜR.
 - E. ACE İNHİBİTÖRLERİ LİPİD PROFİLİNİ ETKİLEMEZ.

1. YAŞLANMAYA BÖBREĞİN VERDİĞİ YANIT İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. 30 YAŞINDAN SONRA GFR'DEKİ DÜŞME HIZI 8 ml/dk/1.73 m²/DEKAD'DIR.
 - B. 40 YAŞINDAN ÖNCE SAĞLIKLI KİŞİDE GLOMERULLERİN % 5'İNDEN AZINDA SKLEROZ VARKEN, 8NCİ DEKADDA GLOMERULLERİN % 40'INDA SKLEROZ GÖRÜLÜR.
 - C. YAŞLANMA İLE RENAL KİTLE KAYBI GÖRÜLÜR VE BUNDAN RENAL MEDULLA KAYBI SORUMLUDUR.
 - D. DİYETTEKİ PROTEİN AZALTILDIKÇA , YAŞLANMAYA BAĞLI PROTEİNÜRİ SIKLIĞI AZALIR.
 - E. 30 YAŞTAN SONRA RENAL KAN AKIMI HER DEKADDA % 10 AZALIR.

1. ÜREMİK KEMİK HASTALIĞINDA HANGİSİ PARATİROİDEKTOMİ ENDİKASYONU DEĞİLDİR ?
 - A. TEDAVİYE DİRENÇLİ KAŞINTI
 - B. CİDDİ HİPERKALSEMİ
 - C. KALSİFİLAKSİS
 - D. HİPOFOSFATEMİ
 - E. KEMİK DIŞI PROGRESİF KALSİFİKASYONLAR

1. GLOMERUL FİLTRASYON KATSAYISI (Kf) İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
 - A. GLOMERUL FİLTRASYON DEĞERİNE KATKISI YOKTUR.
 - B. GLOMERULER PERMEABİLİTE FAKTÖRÜNDEN ETKİLENMEZ.
 - C. GLOMERUL FİLTRASYON ALANI İLE GLOMERULER GEÇİRGENLİĞİN BİR FONKSİYONUDUR.
 - D. AKUT TUBULER NEKROZ PATOGENEZİNE Kf'NİN ETKİSİ YOKTUR.
 - E. GEBELİK SIRASINDA DEĞERİ DEĞİŞMEZ.

1. HANGİSİ BÖBREK BİYOPSİSİ ENDİKASYONU DEĞİLDİR ?

- A. AĞIR PROTEİNÜRİ
- B. UZAMIŞ OLİGÜRİ
- C. ANLAMLI HEMATÜRİ
- D. SLE
- E. POLİKİSTİK BÖBREK

1. IgA NEFROPATİSİNE AŞAĞIDAKİ HASTALIKLARDAN HANGİSİ EŞLİK EDER ?

- A. WHIPPLE HASTALIĞI
- B. SARKOİDOZ
- C. BETA TALASEMİ
- D. RENAL HÜCRELİ KARSİNOM
- E. HEPİ

1. MEMBRANÖZ NEFROPATİ İÇİN YANLIŞ OLANI İŞARETLEYİNİZ.

- A. ERİŞKİNDE EN SIK SAPTANAN NEFROTİK SENDROM NEDENİDİR.
- B. İDİOPATİK FORM % 60-85 SIKLIKTA GÖRÜLÜR.
- C. ERKEKLERDE DAHA SIKTIR.
- D. RADİOGRAFİLERDE BÖBREKLER NORMALDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜRLER.
- E. ÇOCUKLUK ÇAĞI MEMBRANÖZ NEFROPATİLERİNDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI % 60' IN ÜZERİNDEDİR.

1. MALİGNİTEYE EŞLİK EDEN GLOMERUL HASTALIKLARI İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?

- A. MALİGNİTEYE BAĞLI GLOMERULER HASTALIĞI OLANLARIN % 70'İNDE MEMBRANO-PROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT TİP-II GÖRÜLÜR.
- B. HODGKİN LENFOMAYA EN SIK MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI EŞLİK EDER.
- C. MALİGNİTESİ OLAN PROTEİNÜRİK HASTALARIN HİÇBİRİNDE AMİLOİDOZA RASTLANMAMIŞTIR.
- D. BU HASTALARDA PROGNOZU GLOMERULER HİSTOPATOLOJİK BULGULAR TAYİN EDER.
- E. KLL'DE EN SIK MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİT GÖRÜLÜR.

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİNİN KOMPLİKASYONU DEĞİLDİR ?

- A. OTONOM NÖROPATİ
- B. SEREBROVASKÜLER ATAK
- C. OSTEOMALAZİ

- D. GASTROİNTESTİNAL KANAMA
- E. DEMANS

1. ATN İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?

- A. İDRAR OSMOLALİTESİ < 350 mOsm / kg
- B. İDRAR Na > 40 mmol / L
- C. FeNa > % 1
- D. İDRAR KREATİNİN / PLAZMA KREATİNİN > 20
- E. KONTRAST MADDEYE BAĞLI ATN'DE İDRAR DENSİTESİ > 1010

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALDOSTERON SALINIMINI KONTROL EDEMEZ ?

- A. ANGIOTENSİN
- B. Na
- C. K
- D. ADH
- E. ACTH

1. GBM KALINLIĞI A° DUR.

- A. 1.200
- B. 4.800
- C. 3.200
- D. 320
- E. 480

1. TEK NEFRON GFR (SNGFR) DEĞERİ HANGİSİDİR ?

- A. 50 nl/dk
- B. 50 pl/dk
- C. 50µl/dk
- D. 500 nl/dk
- E. 5 nl/dk

1. FUROSEMİD SEGMENTİNDE MEKANİZMASINI İNHİBE EDER.

- A. HENLE KULBU KALIN ÇIKAN KOL , Na/K/2Cl CO-TRANSPORT
- B. HENLE KULBU KALIN ÇIKAN KOL , Na/Li COUNTER-TRANSPORT

- C. PROKSİMAL TUBULUS , AMİLORİDE-SENSITIVE Na TRANSPORT
- D. HENLE KULBU İNEN KOL , Na/K/2Cl CO-TRANSPORT
- E. DİSTAL TUBULUS , AQUAPORIN

1. BÖBREĞİN ASİDİFİKASYON KAPASİTESİNİ HANGİ TEST ORTAYA KOYAR ?

- A. ORTHOTOLUIDİN SULFAT
- B. BERTONİ TESTİ
- C. NaCl TOLERANS TESTİ
- D. HCl TOLERANS TESTİ
- E. AMONYUM KLORÜR TOLERANS TESTİ

1. RENAL TUBULER ASİDOZLAR (RTA) İÇİNDE HİPERPOTASEMİ İLE SEYREDEN HANGİSİDİR ?

- A. FANCONI SENDROMU
- B. GITELMAN SENDROMU
- C. KOMPLET KLASİK DİSTAL RTA
- D. DİSTAL TİP IV RTA
- E. KBY'NE EŞLİK EDEN DİSTAL RTA

1. "GLOMERULER KAPİLLER ENDOTELYOZİS" ADI VERİLEN HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNÜM HANGİ HASTALIĞA ÖZGÜDÜR ?

- A. TIRNAK-DİZ SENDROMU
- B. SKLERODERMA RENAL KRİZİ
- C. GEBELİK TOKSİKOZU
- D. WEGENER GRANULOMATOZU
- E. DİYABETİK NEFROPATİ

1. EN AZ NEFROTOKSİK OLAN AMİNOGLİKOZİD HANGİSİDİR ?

- A. NEOMİSİN
- B. TOBRAMİSİN
- C. AMİKASİN
- D. STREPTOMİSİN
- E. GENTAMİSİN

1. BARTTER SENDROMU İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?

- A. HENLE KULBU ÇIKAN KOLUNA AİT BİR BOZUKLUKTUR.
- B. HİPERRENİNEMİK HİPERALDOSTERONİZM VARDIR.

- C. HER ZAMAN HİPERPOTASEMİ VARDIR.
- D. METABOLİK ALKALOZ SIKTIR.
- E. HİPERALDOSTERONİZME RAĞMEN, HİPERTANSİYON GÖRÜLMEZ.

1. HANGİSİ BÖBREK TRANSPLANTASYONU İÇİN KESİN BİR KONTRENDİKASYONDUR ?

- A. ABO UYUMSUZLUĞU
- B. POZİTİF CROSS-MATCH
- C. OKSALOZİS
- D. DUODENAL ÜLSER
- E. HIV POZİTİFLİĞİ

1. SAĞLIKLI BİR KİŞİNİN İDRAR İÇERİĞİ İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?

- A. FOSFOR MİKTARI ORTALAMA 1.000 mg / GÜN'DÜR.
- B. KREATİNİN MİKTARI ERKEK İÇİN ORTALAMA 20-25 mg/kg/vücut ağırlığı/gün'DÜR.
- C. ÜRİK ASİT MİKTARI 7.500 mg/gün'DÜR.
- D. PROTEİN MİKTARI < 100 mg/gün'DÜR.
- E. KLOR MİKTARI 150-250 mmol/L'DİR.

1. DİABETES MELLİTUSA AŞAĞIDAKİ GLOMERULER HASTALIKLARIN HANGİSİ EŞLİK EDEBİLİR ?

- A. IgA NEFROPATİSİ
- B. MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI
- C. MEMBRANÖZ NEFROPATİ
- D. AMİLOİDOZ
- E. HEPSİ

1. SİSTEMİK VASKÜLİTLER İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?

- A. ESANSİYEL MİKST KRİYOGLOBULİNEMİDE KÜÇÜK ÇAPLI ARTERLER TUTULUR.
- B. PAN BÜYÜK ARTERLERİN HASTALIĞIDIR.
- C. TAKAYASU HASTALIĞINDA MİKROSKOPİK POLİANJİTİS VARDIR.
- D. LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT YALNIZCA ORTA ÇAPLI ARTERLERDE GÖRÜLÜR.
- E. CHURG-STRAUSS SENDROMU BİR ANAFİLAKTOİD PURPURADIR.

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE ANA (+) BULUNUR ?

- A. SLE

- B. CREST SENDROMU
- C. DERMATOMİYOZİT
- D. İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZ
- E. HEPSİ

1. GUT HASTALIĞININ 4NCÜ EVRESİ NE ŞEKİLDE ADLANDIRILIR ?

- A. ASEPTOMATİK HİPERÜRİSEMİ
- B. KRONİK TOFÜSLÜ GUT
- C. İNTERKRİTİKAL GUT
- D. GUT ARTRİTİ-İLK ATAK
- E. HİÇBİRİ

1. GFR'NİN SAĞLIKLI OLARAK BELİRLENEBİLMESİ İÇİN SEÇİLEN TEST MADDESİNİN TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER AÇISINDAN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?

- A. TÜMÜYLE FİLTRE OLABİLMELİDİR.
- B. PLAZMA KONSANTRASYONU STABİL OLMALIDIR.
- C. SEKRETE EDİLMEMELİDİR
- D. REABSORBSİYONU MİNİMAL OLMALIDIR.
- E. METABOLİZE EDİLMEMELİDİR.

1. BİR GÜNDE VÜCUTTAN BÖBREK YOLU İLE ATILMASI GEREKEN METABOLİK SON ÜRÜN MİKTARI NE KADARDIR ?

- A. 300 mOsm
- B. 600 mOsm
- C. 1.200 mOsm
- D. 120 mOsm
- E. 60 mOsm

1. AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ACİL HEMODİYALİZ ENDİKASYONLARI İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?

- A. DİÜRETİĞE YANIT VEREN AKCİĞER ÖDEMİ
- B. ÜREMİK PERİKARDİT
- C. KAYEXELAT TEDAVİSİNE YANIT VEREN HİPERKALEMİ
- D. SERUM BİKARBONAT < 20 mmol/L
- E. ÜREMİK PRURİTUS

1. KBY HASTASINDA KREATİNİN KLİRENSİNİN 50 ml/dk İLE 25 ml/dk ARASINDA OLDUĞU DÖNEM HANGİ ŞEKİLDE ADLANDIRILIR?

- A. RENAL REZERV KAYBI
- B. RENAL YETMEZLİK (FAILURE)
- C. RENAL YETERSİZLİK (INSUFFICIENCY)
- D. PREDİYALİZ DÖNEMİ
- E. SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ (SDBY)

1. DİYALİZ HASTALARINDA MORTALİTE İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?

- A. İLK YILDA MORTALİTE ORANI % 15'DİR.
- B. EN SIK RASTLANAN ÖLÜM NEDENİ KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDIR
- C. SEPSİSE BAĞLI ÖLÜM NADİRDİR.
- D. DİYALİZ TEDAVİSİNDE GEÇEN SÜRE ARTTIKÇA, MORTALİTE ORANI ARTAR
- E. DİYALİZ MEMBRANLARI ARASINDA MORTALİTEYE NEDEN OLMAK AÇISINDAN FARK YOKTUR.

1. PROGRESİF GLOMERULER SKARLAŞMA İLE HİPERLİPİDEMİ İLİŞKİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR ?

- A. KOLESTEROL İÇERİĞİ YÜKSEK DİYETLE BESLENEN RAT GLOMERULLERİNİN MESENGİAL VE EPİTELYAL HÜCRELERİNDE LİPİD BİRİKİMİ GÖRÜLÜR.
- B. OKSİDASYONA UĞRAMIŞ LDL-KOLESTEROLUN MESENGİAL HÜCRELER TARAFINDAN FAGOSİTOZU İLE KÖPÜK HÜCRELER OLUŞUR.
- C. KRONİK GLOMERULONEFRİTİ OLAN HASTALARIN GLOMERULLERİNDE apo (a) BİRİKİMİ VARDIR.
- D. DİYABETİK NEFROPATİNİN PROGRESYONUNU HİPERKOLESTEROLEMİ HIZLANDIRIR.
- E. HEPSİ

1. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE MENTAL DURUMU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ETKİLEMEZ ?

- A. METİL DOPA TEDAVİSİ
- B. ALUMİNYUM
- C. HİPONATREMİ
- D. HİPERKALEMİ
- E. HİPOFOSFATEMİ

1. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE (KBY) GLUKOZ HOMEOSTAZİSİ İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
 - A. KBY İLERLEDİKÇE, İNSÜLİN DÜZEYLERİ DÜŞER
 - B. DOKULARIN İNSÜLİN DUYARLIĞI ARTAR
 - C. YALNIZ DİYABETİK ÜREMİKLERDE GLUKOZ İNTOLERANSI GÖRÜLÜR.
 - D. PARATHORMON PANKREAS BETA HÜCRELERİNİ BLOKE EDEREK İNSÜLİN SEKRESYONUNU AZALTIR.
 - E. PARATIROİDEKTOMİ SONRASINDA GLUKOZ İNTOLERANSI ARTAR.
1. ÜREMİK TOKSİNLER İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. GLİKOZİLASYON SON ÜRÜNLERİ (A-GEP) BETA-2-MİKROGLOBULİNE BAĞLI AMİLOİDOZUN GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.
 - B. ÜREMİK TOKSİNLER PLAZMA CALCİTRİOL DÜZEYİNİ AZALTIR.
 - C. İNDOKSİL SÜLFAT ÜREMİKLERDE GLOMERULER SKARLAŞMAYI HIZLANDIRIR.
 - D. P-KREZOL PMN'LERDE FAGOSİTOZU İNHİBE EDER.
 - E. METİLGUANİDİN TROMBOSİT AGREGASYONUNU BOZAR.
1. SAPD (SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ) PERİTONİTLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
 - A. SAPD PERİTONİTİNDE EN SIK İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR ENTEROBAKTER SUŞLARIDIR.
 - B. EN MORTAL SEYREDEN PERİTONİT TİPİ "SKLEROZAN ENCAPSULATING PERİTONİT" TİR.
 - C. MİKROORGANİZMALAR PERİTON BOŞLUĞUNA EN SIK PERİLUMİNAL YOL İLE GELİR.
 - D. PERİTON SIVISI HÜCRE SAYIMININ > 10 HÜCRE/mm³ OLMASI İLE PERİTONİT TANISI KONUR.
 - E. DİYALİZAT KÜLTÜRÜNDE GRAM(+) ÜREME OLDUĞUNDA KULLANILACAK İLK SIRA İLACI İNTRAPERİTONEAL MEROPENEM OLMALIDIR.
1. BÖBREK TRANSPLANTASYONU ÖNCESİNDE VEYA SIRASINDA HANGİ DURUMLARDA MUTLAKA NEFREKTOMİ YAPILMALIDIR ?
 - A. FOKAL SKLEROZAN GLOMERULONEFRİT
 - B. PERSİSTAN ENFEKSİYON ODAĞI OLAN VE MULTİPL TAŞLAR İÇEREN BÖBREKLER
 - C. POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
 - D. İLACA DİRENÇLİ HİPERTANSİYON
 - E. HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HUS)

1. RENAL TRANSPLANTLI HASTALARA UYGULANAN İMMÜNSUPRESİF İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. SİKLOSPORİN VE FK506 (TACROLIMUS) Ca-BAĞIMLI T-HÜCRE AKTİVASYONUNU BLOKE EDER
 - B. AZATİYOPİRİN PİRİMİDİN SENTEZİNİ İNHİBE EDER.
 - C. MYCOPHENOLAT MOFETİL LENFOSİT-SPEŞİFİK GUANOSİN SENTEZ YOLAĞINI BLOKE EDER
 - D. KORTİKOSTEROİDLER SİTOKİN GEN EKSPRESYONUNU BLOKE EDER.
 - E. RAPAMYCİN BÜYÜME FAKTÖRLERİNE KARŞI AKTİVE LENFOSİT YANITINI İNHİBE EDER.

1. SULFONİLÜRE GRUBUNDAKİ OAD İÇİNDE % 95 ORANINDA BÖBREKTEN İTRAH EDİLEN İLAÇ HANGİSİDİR ?
 - A. GLİBENKLAMİD
 - B. GLİPİZİD
 - C. KLORPROPAMİD
 - D. GLİKLAZİD
 - E. GLİSOKSEPİD

1. SPEŞİFİK BÖBREK HASTALIKLARI İLE GEBELİK İLİŞKİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
 - A. REFLÜ NEFROPATİSİ OLAN GEBELERDE RENAL FONKSİYONLAR PROGRESİF OLARAK BOZULUR
 - B. PAN OLAN GEBELERDE MATERNAL ÖLÜM ORANLARI YÜKSEKTİR
 - C. GEBELİK SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SKLERODERMADA RENAL FONKSİYONLAR HIZLA BOZULUR.
 - D. İgA NEFROPATİLİ GEBELERDE RENAL FONKSİYON BOZULUR
 - E. DİABETİK NEFROPATİLİ GEBELERİN RENAL LEZYONLARINDA PROGRESYON GÖRÜLÜR.

1. AŞAĞIDAKİ HASTALIKLARDAN HANGİSİNDE BÖBREK HASTALIĞINA SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYBI EŞLİK EDER
 - A. ALPORT SENDROMU
 - B. REFSUM HASTALIĞI
 - C. RENAL TUBULER ASİDOZ
 - D. ALSTRÖM HASTALIĞI
 - E. HEPSİ

1. “ULUSLARARASI REFLÜ ÇALIŞMASI KOMİTESİ” KRİTERLERİNE GÖRE VUR DERECELENDİRMESİ İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
- A. BİRİNCİ DERECE : YALNIZ ÜRETERDE REFLÜ
 - B. İKİNCİ DERECE : ÜRETER, PELVİS, KALİKSLERDE REFLÜ + DİLATASYON YOK
 - C. İKİNCİ DERECE : ÜRETERDE REFLÜ + DİLATASYON VAR
 - D. BEŞİNCİ DERECE : ÜRETER, PELVİS VE KALİKSLERDE GROSS DİLATASYON
 - E. ÜÇÜNCÜ DERECE : ÜRETER VE PELVİSTE DİLATASYON + ÜRETERDE TORTUOSİTE ARTIŞI

1. İLACA BAĞLI NEFROPATİLER İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
- A. NSAİD’LER YALNIZCA AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİTE NEDEN OLUR
 - B. ALTIN TUZLARIYLA TEDAVİ EDİLEN ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA NEFROTİK SENDROM İNSİDANSI % 3-17 ARASINDADIR
 - C. KİNOLON ANTİBİYOTİKLERİ İÇİNDE AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİTE EN SIK NORFLOKSASİN NEDEN OLUR.
 - D. CİSPLATİN NEFROTOKSİTESİNE EN SIK HİPERMEGNEZEMİ EŞLİK EDER.
 - E. GANSİKLOVİR ASİKLOVİR’E GÖRE DAHA NEFROTOKSİKTİR.

1. DİÜRETİKLERİN ETKİ YERLERİ İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR ?
- A. ASETOZOLAMİD PROKSİMAL TUBULUSTA ETKİSİNİ GÖSTERİR
 - B. HİDROKLOTİAZİD DİSTAL TUBULUSTA ETKİSİNİ GÖSTERİR
 - C. AMİLORİD TOPLAYICI KANALLARA ETKİ EDER
 - D. FUROSEMİD HENLE KULBUNUN İNCE ÇIKAN KULBUNA ETKİ EDER
 - E. BUMETANİD HENLE KULBUNUN KALIN ÇIKAN KULBUNA ETKİ EDER

1. MYELOMADA BÖBREK TUTULUMU İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
- A. FANCONİ SENDROMU GÖRÜLÜR
 - B. KRONİK RENAL YETMEZLİK NEDENLERİNDEN BİRİSİ AL AMİLOİDOZUDUR
 - C. AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENLERİNDEN BİRİSİ HİPERKALSEMİDİR
 - D. HAFİF ZİNCİR DEPOZİSYONU İLE NEFROTİK SENDROM GÖRÜLÜR.
 - E. HEPSİ

1. DİYALİZ HİPOTANSİYONUNU ENGELLEMELİK İÇİN DİYALİZAT Na KONSANTRASYONU EN AZ NE KADAR OLMALIDIR ?

- A. 15 mmol/L
- B. 25 mmol/L
- C. 145 mmol/L
- D. 110 mmol/L
- E. 88 mmol/L

1. İLERLEMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TİROİD FONKİYON TESTLERİ İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR ?

- A. TSH YÜKSEKTİR
- B. TSH DÜŞÜKTÜR
- C. TSH NORMALDİR
- D. SERBEST T-3 (RIA) YÜKSEKTİR
- E. SERBEST T-4 (RIA) YÜKSEKTİR.